

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta (ďalej len „RVPS Galanta“) **upozorňuje chovateľov ošípaných** v zmysle § 40a Zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov **na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej**, do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje Rozhodnutie Komisie 2006/80/ES, ktorým bola niektorým členským štátom udelená výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 Smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. Týmto **bola zrušená výnimka na registráciu chovov s 1 ošípanou pre vlastnú spotrebu** udelená niektorým členským štátom vrátane Slovenskej republiky.

Z tohto dôvodu všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len 1 kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto novej legislatívy registrované.

Bližšie informácie a tlačivá na registráciu chovu ošípaných získate priamo na RVPS Galanta osobne, telefonicky alebo e-mailom.

RVPS Galanta ďalej upozorňuje na **povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytku, ošípaných, oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu** najmenej jeden pracovný deň vopred **na RVPS Galanta** telefonicky (tel. č.: 031/780 2011,12) alebo elektronicky (e-mail: ZdravieZvierat.GA@svps.sk).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
Hodská 353/19
924 25 Galanta

Tel.: 031/780 20 11,12
E-mail: Riaditel.GA@svps.sk

Regionálna veterinárna a potravinová
správa Galanta
Hodská 353/19
924 25 Galanta

Africký mor ošipaných (AMO) u domácich ošipaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

- akútne, vysoko nákazlivá choroba domácich ošipaných a diviakov
- prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieratom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvierata, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
- prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaniami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
- u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
- charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
- **ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat**

Chovy ošipaných – prevencia

- ✓ dodržiavať v chovoch **zásady biologickej bezpečnosti** (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
- ✓ **zamedziť vniknutiu diviakov** do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
- ✓ rešpektovať **zákaz skrmevania kuchynských odpadov** a výrobkov z diviacieho mäsa
- ✓ **zákaz skladovať krmivo** pre ošipané v dosahu diviakov
- ✓ **zákaz skladovať podstielkovú slamu** v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
- ✓ pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove



Užívatelia poľovných revírov (diviaky) – prevencia

- ✓ odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených **uhynutých diviakov**
- ✓ neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do **kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu**
- ✓ intenzívny odlov diviacej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých **chorých a podozrivých diviakov**
- ✓ dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórií
- ✓ **zákaz prikrmovania diviakov** (výnimka iba za účelom vnadenia)
- ✓ dodržiavanie **biologických zásad** pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
- ✓ odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie **od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPŠ**

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- **Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !**

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošipaných nie je možná.